

## **ANAIS JOBA 2014 – FÓRUM CLÍNICO ACADÊMICO**

### **CISTO ODONTOGÊNICO EPITELIAL CALCIFICANTE ASSOCIADO A ODONTOMA COMPOSTO – RELATO DE CASO**

#### **ODONTOGENIC EPITHELIAL CYST ASSOCIATED CALCIFYING COMPOUND ODONTOMA - CASE REPORT**

Araújo, Luana Lima Gonçalves<sup>1</sup>; Medrado, Alena Peixoto<sup>2</sup>; Rebouças, Deyvid<sup>3</sup>; Marchionni, Antônio Márcio Teixeira<sup>2</sup>

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professores Adjuntos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
3. Residente de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) e Hospital Geral Roberto Santos (HGRS)

#### **Resumo:**

O cisto odontogênico epitelial calcificante apresenta-se como uma cavidade cística intra-óssea revestida por epitélio odontogênico com evidente ceratinização e calcificação. Também chamado de Cisto de Gorlin, acomete mais frequentemente a região anterior dos maxilares e pode estar associado a outras lesões de origem odontogênica, a exemplo do odontoma. Paciente, I. S. B., 4 anos, sexo masculino, compareceu ao Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial com sua genitora, a qual relatou que seu filho apresentava aumento de volume na região vestibular anterior da mandíbula, de crescimento lento e assintomático. Ao exame extraoral, foi observada uma discreta tumefação na região mentoniana esquerda confirmada ao exame intraoral, no qual se percebeu apagamento do fundo de sulco vestibular. Os achados imaginológicos revelaram presença de lesão mista, com halo radiolúcido e região central que exibia estruturas com diferentes graus de radiopacidade. Foi realizada biópsia incisional e os achados histopatológicos indicaram lesão de natureza cística com presença de células fantasmas no epitélio odontogênico, com áreas de calcificação, associada à outra lesão constituída por tecidos mineralizados semelhantes a esmalte e dentina, os quais apresentavam um padrão organizacional de unidades dentárias. O paciente será submetido a novo procedimento para remoção completa da lesão.

**Palavras-chave:** cisto odontogênico epitelial calcificante; odontoma; diagnóstico.

**Keywords:** *calcifying epithelial odontogenic cyst; odontoma; diagnosis.*

---

### **DISPLASIA CEMENTO-ÓSSEA FLORIDA - RELATO DE CASO**

#### **FLORID CEMENTO-OSSEUS DYSPLASIA - CASE REPORT**

Laís Bastos Guimarães<sup>1</sup>; Murillo Leite Mascarenhas<sup>2</sup>; Antônio Lucindo Pinto de Campos Sobrinho<sup>3</sup>; Jamile de Oliveira Sá<sup>3</sup>; Antônio Márcio Teixeira Marchionni<sup>4</sup>; Sílvia Regina de Almeida Reis<sup>4</sup>

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Aluno da Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/ Hospital Geral Roberto Santos (EBMSP/HGRS)
3. Alunos do Mestrado Profissionalizante em Estomatologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
4. Professores Adjuntos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Resumo:

A displasia cemento-óssea florida (DCOF) é uma lesão benigna limitada aos ossos gnáticos, na qual há a substituição de tecido ósseo por tecido conjuntivo fibroso, em mais de um quadrante. Apresenta evolução lenta, assintomática e acomete com maior frequência mulheres melanodermas de meia idade. O caso clínico reporta-se a uma mulher negra com 63 anos de idade que foi encaminhada ao serviço de em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Roberto Santos devido a presença de lesão radiopaca em região de corpo mandibular direito. Ao exame físico extraoral não observou-se assimetria facial e linfonodos palpáveis. Ao exame intra-oral notou-se fístula na mucosa em região de corpo mandibular direito com lesão exposta de cor amarelada e restrita à área do osso alveolar e sem sinais de infecção. Na radiografia panorâmica identificou-se múltiplas áreas radiopacas irregulares e dispostas na região de corpo mandibular bilateral e em maxila posterior esquerda. Os achados clínicos e imaginológicos levaram a suspeita de displasia cemento-óssea florida. Realizada a biópsia excisional, o resultado do exame anatomopatológico confirmou a suspeita inicial. Foi instituída a conduta terapêutica cirúrgica e a paciente encontra-se em preservação. O pós-operatório de 2 anos mostrou o rebordo alveolar dos lados direito e esquerdo com mucosa íntegra e sem área de exposição óssea. O diagnóstico da displasia cemento-óssea florida é responsabilidade do cirurgião-dentista, através do qual faz-se necessário o conhecimento de outras patologias que possuem características semelhantes.

Palavras-chave: lesões fibro-ósseas; displasia cemento-óssea florida; diagnóstico.

*Keywords: fibro-osseous lesions; florid cemento-osseous; diagnostic.*

---

## **GENGIVO E OSTEOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE SORRISO GENGIVAL GINGIVOPLASTY AND OSTEOPLASTY FOR GUMMY SMILE CORRECTION**

Araújo, Priscila de Azevêdo<sup>1</sup>; Ribeiro, Érica Del Peloso<sup>2</sup>; Bittencourt, Sandro<sup>3</sup>

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
3. Professor do Curso de Odontologia e dos Cursos Aperfeiçoamento em Periodontia e Implantodontia da Faculdade de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Resumo:

A estética periodontal tem sido bastante valorizada para a harmonia do sorriso. Quando existe uma desproporção entre o tamanho do dente e a quantidade de gengiva, em que a margem gengival está posicionada muito coronalmente em relação à junção cemento-esmalte, ocorre o que se conhece por “sorriso gengival”. Tal desarmonia pode causar insatisfação do paciente. As indicações para cirurgia periodontal estética são as seguintes: dentes anteriores curtos ou com exposição

excessiva de tecido gengival e contorno irregular da gengiva. Este trabalho tem como objetivo enfatizar, através da apresentação de um caso clínico, a importância da gengivoplastia e osteotomia para correção de sorriso gengival. Paciente do sexo feminino, 22 anos, faioderma, estudante do curso de odontologia, que tinha como queixa principal “não gosto do meu sorriso, pois mostro muita gengiva”. Após constatação de saúde periodontal, através de exames clínico e radiográfico, a paciente foi submetida a gengivo e osteoplastia. Após o procedimento, a paciente considerou-se satisfeita com seu sorriso.

Palavras-chave: cirurgia periodontal; sorriso e estética.

*Keywords: periodontal surgery; smile and esthetic*

---

## **IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTÉTICO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS: RELATO DE CASO**

### **IMPORTANCE OF AESTHETIC PLANNING IN DIRECT RESTORATIONS: A CASE REPORT**

Shibasaki, Danielle Nishitani<sup>1</sup>; Cavalcanti, Andrea Nóbrega<sup>2</sup>; Azevedo, Juliana Felippi<sup>2</sup>  
David, Goés<sup>2</sup>

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

#### **Resumo:**

A estética é muito valorizada na sociedade e influenciada pela mídia e por esse motivo a busca por recursos e procedimentos que auxiliem em um melhor resultado na harmonia do sorriso vem crescendo nos últimos tempos. O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância do planejamento estético na reconstrução direta e conservadora do terço incisal dos Incisivos centrais superiores. Paciente JSS, 22 anos, sexo feminino, compareceu ao ambulatório da escola Bahiana de medicina e saúde pública relatando que há alguns meses atrás sofreu um acidente de ônibus, onde fraturou os incisivos centrais. Relatou que foi conduzida ao Hospital Roberto Santos onde foram realizadas as radiografias e logo em seguida encaminhada para o ADAB. Foi realizada a anamnese da paciente, onde não foi constatado nenhum problema de saúde, e fotografias intra e extra orais para a avaliação detalhada das proporções e simetrias faciais. Foi realizado o tratamento endodôntico na unidade 2.1 e 1.1, a moldagem e modelagem da arcada superior e inferior e confecção do enceramento diagnóstico. Através do enceramento diagnóstico foi possível realizar o molde de silicóna de adição, este serviu como guia para a reconstrução dos incisivos centrais. A confecção do planejamento proporcionou uma visão do pós-operatório e auxiliou no momento da restauração dental, proporcionando um melhor resultado. Conclui-se que os planejamentos estéticos, quando realizados de forma individualizada e utilizando os meios auxiliares adequados, facilitam a realização de restaurações diretas, mais conservadoras e que proporcionam um resultado estético satisfatório.

Palavras-chaves: planejamento estético; odontologia restauradora; resinas compostas.

*Keywords: aesthetic planning; restorative dentistry; composite resins.*

---

### **LIPOMA: APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO.**

### **LIPOMA: PRESENTATION OF CLINICAL CASE.**

D' Araújo, Verena<sup>1</sup>; Costa, Emanuelle<sup>1</sup>; Prates, Lívia<sup>2</sup>; Perez, Adriano<sup>2</sup>.

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

#### **Resumo:**

Lipoma é uma neoplasia mesenquimal benigna de tecido adiposo, usualmente revestida por uma fina cápsula de tecido fibroso, podendo ocorrer em diferentes regiões do corpo onde haja tecido adiposo. Sua etiopatogenia continua incerta, embora é conhecida a influência de fatores hormonais e inflamatórios. Apresenta-se de diversas formas, com base sésil ou pediculada, única ou lobulada, bem delimitado, indolor, podendo ser superficial ou profundo. Este trabalho tem como objetivo ilustrar um caso clínico de remoção cirúrgica de lipoma. Paciente M.A.C.S., gênero feminino, 54 anos, apresentou-se ao Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Geral Roberto Santos queixando-se de uma “massa” na face. O exame revelou aumento de volume indolor, de consistência ligeiramente flácida, móvel e sem sinais de aderência aos planos adjacentes, estendendo-se desde a região masseterina inferior direita até a região submandibular homolateral, de evolução lenta e progressiva. Foi realizada punção aspirativa da lesão para afastar lesões vasculares, e ultrassonografia, que revelou imagem hipodensa. Os dados clínicos apontaram, suspeita diagnóstica de lipoma. O exame de imagem foi complementado por tomografia computadorizada (TC), a fim de melhor avaliar os limites da lesão e sua relação com as estruturas anatômicas em torno e definir a abordagem cirúrgica. A lesão foi removida através de incisão intrabucal, em vestibulo ínfero-posterior direito, com dissecação romba dos planos em torno da lesão. A lesão, de cor amarelada e medindo 6 cm em seu maior diâmetro, foi inteiramente removida e acondicionada em frasco com formol a 10%, mantendo-se na superfície, fato que sugere fortemente tratar-se de lipoma.

Palavras-chaves: lipoma; neoplasias.

*Keywords: lipoma; neoplasms.*

---

### **MARGEM DE SEGURANÇA COM CRIOTERAPIA EM LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES**

### **DEVITALIZING RESIDUAL CAVITY WITH CRYOTHERAPY IN BONE LESIONS OF THE JAWS**

Espinheira, Paula Rizerio D'Andrea<sup>1</sup>; Cerqueira, Arlei<sup>2</sup>

1. Aluna do Curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia da UFBA (FOUFBA)
2. Professor Adjunto da Faculdade de Odontologia da UFBA (FOUFBA)

#### **Resumo:**

A Crioterapia é definida na língua portuguesa como forma de tratamento que consiste no uso local ou geral de frio. Seu uso como modalidade terapêutica em lesões dos

maxilares vem sendo aplicado desde as décadas de 60 e 70, sendo discutida na literatura desde então. Os princípios biofísicos se referem à agressão de lesões em mucosas, ossos e pele através do congelamento da área afetada, seguido pelo reaquecimento lento e a repetição do processo de congelamento, criando, assim, choque térmico. A morte celular ocorre nos tecidos pela formação de cristais citoplasmáticos associados a distúrbios osmótico e elétrico. Nos maxilares suas principais indicações contemplam lesões localmente agressivas com altas taxas de recidiva necessitando ressecções com margem de segurança. Esta técnica se encaixa idealmente, já que minimiza a recorrência da lesão, diminui ou elimina os restos epiteliais ou cistos satélites e, conseqüentemente, reduz a necessidade de ampla ressecção e suas sequelas. A criocirurgia apresenta importante vantagem ao tratar lesões ósseas uma vez que gera morte celular intraóssea, porém a estrutura inorgânica permanece intacta funcionando como matriz para a neoformação óssea. Os resultados de curetagem seguida pela crioterapia com nitrogênio líquido podem ser descritos como incentivadores. O presente trabalho aborda os principais aspectos desta modalidade terapêutica, sua técnica e as possíveis complicações, sendo ilustrado com dois relatos de caso tratados por meio desta técnica.

Palavras-chave: crioterapia; patologia bucal; cirurgia.

*Keywords: cryotherapy; oral pathology; surgery.*

---

## **PINO DE FIBRA DE VIDRO ANATÔMICO: UM RELATO DE CASO**

### **ANATOMIC FIBER POST: A CASE REPORT**

Valois, Jade Carvalho<sup>1</sup>; Achy, Andressa Silva Anjos<sup>1</sup>; Jacobina, Matheus<sup>2</sup>; Moreira, Alexandre Andrade<sup>3</sup>

1. Alunas do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Associação Brasileira de Odontologia (ABO-BA)
3. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Resumo:

Com a finalidade de reconstruir a porção coronária perdida, a utilização de retentores intra-radulares é recomendada para realizar procedimentos restauradores objetivando devolver estética, forma e funcionalidade ao elemento dental. Os pinos intra-radulares pré-fabricados de fibra de vidro vêm experimentando uma aceitação cada vez maior e sendo largamente empregados em procedimentos restauradores, principalmente em dentes fragilizados onde o módulo de elasticidade do retentor tem papel fundamental na sua escolha, sendo o do pino de fibra de vidro bem próximo ao da dentina, o que favorece a sua indicação. Contudo, em casos de canais amplos, os pinos de fibra por serem pré-fabricados, podem não possuir diâmetro suficiente para estarem perfeitamente adaptados, evidenciando que nem sempre a espessura do pino corresponderá à espessura do conduto. Como alternativa, podem ser confeccionados pinos anatômicos, que associam resina composta a pinos pré-fabricados de fibra de vidro. Optamos por apresentar neste trabalho a sequência detalhada da confecção do pino anatômico de fibra de vidro direto, através de um caso clínico e discutir sobre o emprego desta técnica.

Palavras-chave: pinos de fibra de vidro; pinos anatômicos; pinos dentários.

*Keywords: pin fiberglass; anatomical pins; dental pins.*

---

## **PROVISIONALIZAÇÃO EM CARGA IMEDIATA COM REMANESCENTE DENTÁRIO: RELATO DE CASO**

### **IMMEDIATING LOADING WITH REMAINING TOOTH STRUCTURE: CASE REPORT**

Pedreira, Larissa Lima<sup>1</sup>; Júnior, Morbeck dos Santos Leal<sup>2</sup>

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA); Especialista em Prótese Dentária e Implantodontia.

#### **Resumo:**

Durante anos as técnicas de reabilitação oral vêm sendo aprimoradas. Nesse ínterim, a Implantodontia revolucionou e continua revolucionando o campo das reposições dentárias de maneira fixa, no que denominou-se de “terceira dentição” a partir dos estudos do prof. Branemark na década de 60.(Branemark et al. 1969). Atualmente, a aplicação do conceito de carga imediata, permitiu que um paciente tenha possibilidade de ser reabilitado com próteses provisórias logo após a instalação de um implante dentário. Dentre as diversas técnicas de confecção de provisórios, existe a possibilidade de utilizar um dente natural do próprio paciente, com as vantagens de devolver de forma prática e rápida sua funcionalidade e estética, devido a unidade extraída geralmente já trazer a cor, tamanho, formato e textura dos dentes adjacentes. Este trabalho tem como objetivo o relato de um caso clínico de reabilitação de primeiros molares inferiores contralaterais com implantes osseointegrados em carga imediata. Em um dos lados foi utilizada a coroa dentária do dente adjacente ao espaço e que havia indicação de exodontia e do outro esse foi duplicado em acrílico para que pudesse manter a proporcionalidade, mas sendo feito de modo convencional às próteses provisórias acrílicas. Ao utilizar o dente natural o cirurgião-dentista, além de preservar a estética, tem a possibilidade de conservar o dente do paciente, diminuindo custos da confecção de provisório com resina acrílica e promove melhor adaptação na interface dente-tecido gengival.

Palavras-chave: implante; carga imediata; remanescente dentário.

*Keywords: implant; immediating loading; remaining tooth structure.*

---

## **REABILITAÇÃO ESTÉTICA COM RESINA COMPOSTA EM DENTES ANTERIORES COM DIASTEMAS**

### **ESTHETIC REHABILITATION WITH COMPOSITE RESIN IN ANTERIOR TEETH WITH DIASTEMAS**

Martins, Vivian Leite<sup>1</sup>; Azevedo, Juliana Felippi<sup>2</sup>; Leal, Clara Lemos<sup>3</sup>; Cavalcanti, Andrea Nóbrega<sup>2</sup>

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
3. Mestre em Clínica Odontológica pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

#### **Resumo:**

A melhoria do sorriso por meio de procedimentos estéticos representa uma grande demanda da sociedade contemporânea, quando bem planejadas, as reabilitações com resina composta têm demonstrado excelentes resultados, mesmo em casos mais extensos, como aumentos incisais, grandes restaurações e fechamento de diastemas. Este relato de caso tem por objetivo descrever a reabilitação estética envolvendo o fechamento de diastemas entre caninos e incisivos e o aumento incisal em todas as unidades anteriores superiores. Anteriormente à restauração foi realizado o planejamento digital, enceramento diagnóstico e um ensaio restaurador intra-oral, possibilitando melhor prognóstico. Para a realização do procedimento foi selecionado o compósito nano-híbrido IPS Empress Direct (*Ivoclar Vivadent*, Schaan, Liechtenstein) nas cores A2E, A2D, Trans 30 e Trans Opal. A resina composta, aliando bons efeitos ópticos, boa técnica e manuseio e excelente polimento, se mostrou uma ótima alternativa para resolução do caso clínico, sendo uma boa opção para esse tipo de reabilitação estética.

Palavras-chave: diastema; restauração dental permanente.

*Keywords: diastema; dental restoration; permanent.*

---

## **REABILITAÇÃO ESTÉTICA MULTIDISCIPLINAR EM DENTES ANTERIORES: RELATO DE CASO**

### **MULTIDISCIPLINARY REHABILITATION FOR AESTHETIC ANTERIOR TEETH: CASE REPORT**

Santos, Janaina E. Damasceno dos<sup>1</sup>; Cavalcanti, Andréa Nobrega<sup>2</sup>; Bittencourt, Sandro<sup>2</sup>

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professores Adjuntos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

#### **Resumo:**

A busca pela estética do sorriso é uma demanda frequente nos consultórios odontológicos. O objetivo deste trabalho é descrever um caso clínico de reabilitação estética em dentes anteriores com resolução multidisciplinar entre Dentística, Prótese e Periodontia. Paciente do sexo feminino A. F. queixava-se do aspecto das suas restaurações em dentes anteriores e buscava a substituição por laminados cerâmicos. Após o planejamento digital pela técnica do DSD (Digital Smile Design) uma opção multidisciplinar de tratamento foi proposta à paciente. Nesta, a substituição das restaurações seria realizada após recontorno gengival da região dos dentes anteriores superiores e clareamento dental das demais unidades. Nas unidades 12, 21 e 22 foram realizados preparos para facetas e na unidade 11, para coroa total e o material utilizado para estas restaurações foi a cerâmica vítrea reforçada com dissilicato de lítio (e.max Ivoclar). Ao final do tratamento, observou-se que o sucesso está diretamente ligado ao planejamento adequado e enfoque multidisciplinar.

Palavras-chave: laminados cerâmicos; dentística; estética.

*keywords: ceramic laminates ; dentistry; aesthetics.*

---

## **REMOÇÃO DE NÚCLEOS METÁLICOS FUNDIDOS: RELATO DE CASO CLÍNICO**

## REMOVAL OF METTALIC CAST CORE POST: CASE STUDY

Castro, Fabiana Magno Baptista de Almeida<sup>1</sup>; Meyer, Guilherme Andrade<sup>2</sup>; Oliveira, Viviane Maia<sup>3</sup>

1. Aluno do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA), Professor Assistente da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
3. Professora Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA), Professora Adjunto da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

### Resumo:

A destruição da coroa dentária pode ser causada por fatores como trauma, cárie ou desgaste, devendo ser restabelecido o seu contorno final, após a resolução do problema. No entanto quando o remanescente dental estiver insuficiente para resistir às forças mastigatórias é indicado o tratamento endodôntico da unidade. Após este procedimento torna-se necessário o restabelecimento de resistência mecânica comprometida, que muitas vezes é realizado por meio da instalação dos retentores intrarradiculares. Destes os mais utilizados e de maior estudo clínico são os núcleos metálicos fundidos e os pinos de fibra de vidro. Em casos de insucessos do tratamento endodôntico ou falta de reparo tecidual, planejamento protético inadequado, infiltração marginal e/ou cáries e comprimento e diâmetro inadequados dos retentores faz-se necessária a remoção dos mesmos. A técnica mais eficaz descrita na literatura é a associação de desgaste com brocas, ultrassom na linha do cimento e posteriormente força de tração mecânica. O objetivo deste trabalho é abordar sobre a remoção de núcleos metálicos fundidos a partir do estudo de caso clínico realizado na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Paciente possuía três unidades dentárias com núcleos metálicos fundidos inadequados, por isso foi realizada a remoção destes através do desgaste com brocas, do uso do ultrassom e foi feita a confecção de novos retentores intrarradiculares. Durante essa realização existem riscos e dificuldades, sendo fundamental uma avaliação criteriosa das condições em que o remanescente e o retentor se encontram, para obter o máximo de cuidados e definir a melhor técnica a ser utilizada.

Palavras-chaves: pinos dentários; técnica para retentor intrarradicular; endodontia.

*Keywords: dental pins; post and core technique; endodontics.*

---

## SÍNDROME DE VAN DER WOUDE: RELATO DE CASO

### VAN DER WOUDE SYNDROME: CASE REPORT

Viena, Camila Sane<sup>1</sup>; Fonseca, Elisabeth Martinez<sup>1</sup>; Veiga, Patrícia de Castro<sup>2</sup>; Medrado, Alena Ribeiro<sup>2</sup>; Reis, Silvia Regina de Almeida<sup>2</sup>

1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

### Resumo:

A Síndrome de Van der Woude (SVW) é uma má formação congênita herdada geneticamente por um traço autossômico dominante de alta penetrância, atribuída a microdeleções nas bandas cromossômicas 1q32-q41. O gene IRF6 está localizado na região crítica para SVW e tem suas mutações relacionadas à síndrome. Fenotipicamente, a SVW é caracterizada pela presença de fissura de lábio e/ou palato associada às fossetas no lábio inferior e ocasionalmente à hipodontia. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso da SVW com ênfase nas características clínicas. Paciente do sexo feminino, 7 anos de idade apresenta fossetas bilaterais no lábio inferior e fissura labiopalatina bilateral já operada. Radiograficamente, observa-se presença de dente supranumerário em ambos os lados da maxila na região de incisivo lateral, denominados de precaninos, um deles em situação de impacção e agenesia das unidades 12 e 21. Apresenta ainda histórico familiar materno e paterno de fendas orofaciais não associadas às fossetas no lábio inferior. A exposição desse caso alerta para a necessidade do cirurgião dentista conhecer as características da SVW a fim de realizar diagnóstico precoce, o que contribui para melhor planejamento no tratamento do portador da síndrome.

Palavras-chave: Síndrome de Van der Woude; fissura de lábio e/ou palato; fossetas no lábio inferior.

*Keywords: Van der Woude syndrome; cleft lip and / or palate; lower lip pits.*

---

## TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA: RELATO DE CASO

### SURGICAL TREATMENT OF CLEFT PALATE: A CASE REPORT

Bastos, Lorena<sup>1</sup>; Pereira Jr, Fernando Bastos<sup>2</sup>

3. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
4. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Resumo:

A fissura palatina é uma má-formação congênita caracterizada pela falta de fusão do processo palatino durante o período intrauterino. A etiologia é considerada multifatorial e inclui fatores hereditários e ambientais. O indivíduo portador de fissura palatina apresenta problemas de fala, dentários, auditivos, de alimentação e emocionais. O tratamento deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de fenda palatina pós-forame em uma paciente de 36 anos de idade, do gênero feminino, sem nenhum tratamento prévio. Baseando-se na literatura científica destacamos aspectos que mostram que o correto diagnóstico melhora as decisões clínicas referentes à reconstrução palatal, e que a procura pela técnica cirúrgica que obtenha melhor resultado é uma busca constante.

Palavras-chave: diagnóstico; tratamento; fissura palatina.

*Keywords: diagnosis; treatment; cleft palate.*